

# تقویم واکسیناسیون

برای محافظت از نوزادان عزیز خود در برابر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن (با VPD)، به یاد داشته باشید انجام واکسیناسیون نوزادان در زمان های مقرر و مناسب بسیار با اهمیت است. این برنامه، پیشنهادی برای ایجاد مصونیت در برابر بیماری ها در نوزادان و کودکان است که توسط انجمن «**KNOW ★ VPD**» از نوزادان مان محافظت کنیم» (NPO) ارائه شده است. در رابطه با واکسیناسیون اطفال، باید با توجه به چگونگی توزیع واکسن در محل سکونت خود و وضعیت شیوع VPD، با پزشک خانواده خود مشورت کرده و پس از آن برای واکسیناسیون برنامه ریزی کنید.

نام واکسن	انجام شده	سال (سال تمام)
هیپاتیت ب (به استثنای جلوگیری از عفونت پری ناتال)	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
روتاویروس (واکسن خوراکی)	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
استریتوکوک پنومونیه نوزادان	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
پنج نوع ترکیبی (دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوآنزای نوع ب (Hib))	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
سل (ب.ت.ز)	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
ام آر (ترکیبی سرخک و سرخچه)	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
آبله مرغان	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
اوربون	اختیاری	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
التهاب مغز ژاپنی	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
کرونا نوع جدید mRNA	اختیاری	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
آنفلوآنزا	اختیاری	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
HPV (پاپیلوم انسانی) (۲ ظرفیتی، ۴ ظرفیتی، ۹ ظرفیتی)	روئین	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
مننژیت	اختیاری	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
واکسن برای مسافران		۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳

**روئین**: در صورت دریافت در دوره مقرر و تعیین شده اساساً رایگان (تقلیل هزینه با ارگان های دولتی).

**اختیاری**: در اکثر موارد دارای هزینه (تقلیل هزینه با شخص) پرداخت یارانه توسط برخی شهرداری ها. انجام واکسیناسیون های اختیاری به اندازه واکسیناسیون های دوره ای و روئین، ضروری هستند.

● بین تزریق واکسن های زنده متفاوت، حداقل فاصله ۴ هفته ای ضروری است. (واکسیناسیون پس از گذشت ۴ هفته کامل از واکسیناسیون قبلی امکان پذیر است)

**واکسن زنده**

**واکسن غیر فعال**

**واکسن mRNA**

در هنگام سفرهای خارجی، بجز موارد ذکر شده درجالی، ممکن است انجام واکسیناسیون برای بیماری هایی مانند تب زرد، هیپاتیت آ، هاری و غیره نیز نیاز باشد. اگر برنامه ای برای سفر به خارج از کشور دارید، در اسرع وقت با کلینیک های مسافرتی و غیره در رابطه با واکسیناسیون مشورت کنید.

انجام واکسن جبرانی (رایگان) در پایان ماه مارس ۲۰۲۵ خاتمه میابد. لطفاً هر چه سریعتر واکسیناسیون را انجام دهید.

مردان مبتلایان واکسن ۴ ظرفیتی دریافت کنند. در مورد واکسن ۹ ظرفیتی برای اول دریافت برای افراد زیر ۱۵ سال ۲ بار و یا ۳ بار دریافت و برای افراد بالای ۱۵ سال ۳ بار دریافت.

انجام واکسیناسیون برای دیستانی های سال ششمی توصیه می شود. (واکسیناسیون روئین برای دختران ششم دیستانی تا اول دبیرستانی)

از ۲ سالگی امکان دریافت وجود دارد. انجام واکسیناسیون به افرادی مانند افرادی که قصد دارند در خارج درس بخوانند دانشجویان خارجی یا افرادی که در خوابگاه سکونت دارند، توصیه می شود.

توصیه می شود که انجام واکسیناسیون، هر ساله بین ماه اکتبر و نوامبر باشد.

زمان دریافت پیشنهادی (اعداد مربوط به تعداد دفعات دریافت)

زمان دریافت پیشنهادی که در راهنمای داخل بسته قید نشده اند.

در صورت تزریق واکسن های زنده متفاوت، حداقل فاصله ۴ هفته ای ضروری است. (واکسیناسیون پس از گذشت ۴ هفته کامل از واکسیناسیون قبلی امکان پذیر است)