

ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အချိန်ဇယား

အရေးပါလှသောကလေးငယ်များကို VPD(ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သောရောဂါ)များမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆေးထိုးနိုင်သောအချိန်ကာလရောက်ပြီဆိုပါက တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုကုန် ရှိသည့်အချိန်တွင် မမေ့မလျော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအချိန်ဇယားသည် KNOW-VPD! Protect Our Children အရ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကာလစောစောစွာရှိနိုင်စေရန်အတွက် အဆိုပြုချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေး၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသအလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနည်းလမ်းနှင့် VPD ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတို့အပေါ်လိုက်ပြီး ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှသာ အချိန်ဇယားဆွဲကြပါ။

ကာကွယ်ဆေးအမည်	ဆေးထိုးပြီး	(အသက်ပြည့်)																																																																																																		
		၀ နှစ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃	၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂	၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁	၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀	၉၁	၉၂	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆	၉၇	၉၈
<p>ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>အသည်းရောင် B (မိခင်မှကလေးသို့ကူးစက်မှု ကာကွယ်ခြင်းမပါဝင်)</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐☐</p>	<p>အသက် ၀ နှစ်အတွင်း ဆေး ၃ ကြိမ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါ။ ၃ ကြိမ်မြောက်ဆေးထိုးခြင်းသည် ၂ ကြိမ်မြောက်ထိုးခြင်းမှ ၄-၅ လ ခြားရမည်ဖြစ်သည်။ အသက် ၁ နှစ်ကျော်ဖြစ်သော်လည်း ဆေးထိုးရသေးပါက တတ်နိုင်သမျှ စောစောကာကွယ်ဆေးထိုးရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ (ဆန္ဒအလျောက်ဆေးထိုးခြင်း)</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>Rota Virus (သောက်ဆေးကာကွယ်ဆေး)</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐</p>	<p>Rota Virus ကာကွယ်ဆေးတွင် ပိုးအမျိုးအစား ၁ မျိုး ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပိုးအမျိုးအစား ၅ မျိုး ကာကွယ်ဆေးတို့ ရှိပါသည်။ နောက်အကျဆုံးအနေနှင့် မွေးဖွားပြီးနောက် ၁၄ ပတ် ၆ ရက်သားမတိုင်မီအတွင်း တိုက်ကျွေးမှုစတင်ပြီး ဆေးအသီးသီး၏ လိုအပ်သောတိုက်ကျွေးမှုကြိမ်ရေအတိုင်း တိုက်ကျွေးပေးရပါမည်။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>Pediatric Pneumococcal</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐☐☐</p>	<p>Rota Virus Pediatric Pneumococcal ငါးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေးတို့၏ ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သည့်အကြိမ်ရေ စောစောစွာပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက် တစ်ချိန်တည်းဆေးထိုးရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>ငါးမျိုးစပ် (ဆုံဆို့နာ၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး မေးနှိုင်း၊ ဝိုလီယံ၊ အဆုတ်ရောင်တီ)</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐☐☐</p>	<p>ကြက်ညှာချောင်းဆုံကူးစက်မှု ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေးကို ၁ ကြိမ် ထိုးရပါမည်။ (ဆန္ဒအလျောက်ဆေးထိုးခြင်း) WHO သည်လည်း ဤကာလအတွက် နောက်ဆက်တွဲဆေးထိုးရန်ကို အကြံပြုတိုက်တွန်းပါသည်။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>BCG</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐</p>	<p>ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အသက် ၄ နှစ်နှင့်အထက်၌ ဝိုလီယံကာကွယ်ဆေး ထိုးကြသည့်မှာ သာမန်ပင်ဖြစ်သည်။ (ဆန္ဒအလျောက်ဆေးထိုးခြင်း)</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>MR (ဝက်သက်ဂျိုက်သိုးနှစ်မျိုးစပ်)</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐</p>	<p>သုငယ်တန်းနှင့်ကလေးတန်းကျောင်း အရွယ်အကြီးဝိုင်းမှကလေးများအတွက် အသက်ငါးနှစ်၊ မြောက်နှစ်နှင့် ၄လ-၆လ ကာလကို အကြံပြုပါသည်။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>ရေကျောက် (အရည်ကြည်ဖုပေါက်)</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐</p>	<p>အသက် ၁ နှစ်ပြည့်ပြီးသားပါက တစ်ချိန်တည်းဆေးထိုးကြပါစို့။ Pediatric Pneumococcal ငါးမျိုးစပ်ဆေး၊ MR၊ ရေကျောက်၊ ပါးချိတ်ရောင်တို့ ဆေး ၅ လုံးကို တစ်ချိန်တည်းထိုးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>ပါးချိတ်ရောင်</p>	<p>ဆန္ဒ အလျောက်</p> <p>☐☐</p>	<p>ခုခံအား သေချာစွာရှိနိုင်ရန်အတွက် ၂ ကြိမ် ခံယူပါ။ (*)</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐☐☐</p>	<p>စံအားဖြင့် အသက် ၃ နှစ်မှစတင်ထိုးသော်လည်း မွေးပြီး ၆ လမှစတင်၍ ထိုးနိုင်ပါသည်။</p>																																																																																																		
<p>mRNA ကာကွယ်ဆေး</p> <p>အမျိုးအစားသစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ</p>	<p>ဆန္ဒ အလျောက်</p>	<p>ကာကွယ်ဆေးထိုးရမည့်အသက်နှင့် ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးထိုးရမည့်အချိန်ဇယားကွဲပြားပါသည်။ နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို ကြိုတင်အတည်ပြုပါ။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>တုတ်ကျွေး</p>	<p>ဆန္ဒ အလျောက်</p> <p>ဆေးထိုးရမည့်တိုင်း</p>	<p>နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလလောက်တွင် ဆေးထိုးကြပါစို့။</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>HPV (ပိုးအမျိုးအစား ၂ မျိုး၊ ၄ မျိုး၊ ၉ မျိုး) (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဗိုင်းရပ်စ်)</p>	<p>သတ်မှတ် ကာလ</p> <p>☐☐☐</p>	<p>Catch-up(အစီလိုက်)နည်းလမ်းဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းတိုက်ကျွေးခြင်း (အပူ)သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် မတ်လအထိရှိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စောစော ထိုးနှံတိုက်ကျွေးပါ။</p> <p>ယောက်ျားလေးများသည် ပိုး ၄ မျိုးကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနိုင်ပါသည်။ (ဆန္ဒအလျောက်ဆေးထိုးခြင်း)</p> <p>ပိုး ၄ မျိုးကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါက ပထမဆုံးအကြိမ်ဆေးထိုးခြင်းသည် အသက် ၁၅ နှစ်အောက်ဖြစ်သည့်အခါ ၂ ကြိမ် သို့မဟုတ် ၃ ကြိမ် ဆေးထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသက် ၁၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ပါက ၃ ကြိမ်ထိုးရပါမည်။</p> <p>မူလတန်းအဆင့် ဆင့်မှစတင်ရောက်ပါက ဆေးထိုးမှုမဟုတ်ပါ။ (သတ်မှတ်ကာလအလိုက်ဆေးထိုးရန်အကျိုးပင်သွား မူလတန်းအဆင့် ဆင့်မှစတင်အထက်တန်းအဆင့် ပထမနှစ်အတွင်းရှိမိန်းကလေးများ)</p>																																																																																																		
<p>ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး</p> <p>ကူးစက်မြန်နှုန်းနှောင့်အမြှေးရောင်</p>	<p>ဆန္ဒ အလျောက်</p> <p>☐</p>	<p>အသက် ၂ နှစ်မှစတင်၍ ဆေးထိုးနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနှင့် အဆောင်နေသူများ စသည်တို့ကို ဆေးထိုးရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါသည်။</p>																																																																																																		
<p>ပြည်ပထွက်ခွာမှုဆိုင်ရာကာကွယ်ဆေး</p>	<p>☐</p>	<p>ပြည်ပသို့ထွက်ခွာမပြုမည့်အချိန်တွင် အထက်ပါကာကွယ်ဆေးများအပြင် yellow fever အသည်းရောင် A၊ ချွေးပူပြန်ရောဂါစသည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများရှိပါသည်။ ပြည်ပထွက်ခွာမည့်သတ်မှတ်ပြီးပါက တတ်နိုင်သမျှ စောစောစွာ ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာဆေးခန်းများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါစို့။</p>																																																																																																		

ရိုးအရှင်ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး သတ်မှတ် ကာလ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းဆေးထိုးမှုပြုပါက မူအရအခမဲ့ဖြစ် (ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာမှကျခံ)။
 ရိုးအားပေးပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေး ဆန္ဒ အလျောက် အများစုမှာအခမဲ့ဖြစ် (ကိုယ်တိုင်ကျခံ)။ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာမှထောက်ပံ့ပေးခြင်းမျိုးရှိပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်မှုမှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းထိုးရမည့်ကာကွယ်ဆေးနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
 mRNA ကာကွယ်ဆေး mRNA ကာကွယ်ဆေး

☐ သတ်မှတ်ကာလအလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အကျိုးပင်သည့်အသက်
 ↔ ဆေးထိုးရန်အကြံပြုလိုသည့်ကာလ (ကိုးကဏန်းများမှာ ဆေးထိုးရမည့်ကြိမ်ရေဖြစ်)
 (*) ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်း ဆေးထိုးရန်အကြံပြုတိုက်တွန်းပါသည်။

☐ ဆန္ဒအလျောက်ဆေးထိုးခြင်းအတွက် ဆေးထိုးနိုင်မည့်အသက်
 ↔ ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့် အကြံပြုလိုသော ဆေးထိုးရန်အချိန်ကာလ

* မတူညီသောအမျိုးအစားဖြစ်သည့် ပိုးအရှင်ပါဝင်သောကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးများ တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးအကြား ခြားထားရမည့်ကာလမှာ အနည်းဆုံး ၄ ပတ် ဖြစ်သည် (၄ ပတ်ကြားပြီးနောက် တူညီသောရက်မှစ၍ ဆေးထိုးမှုပြုနိုင်ပါသည်။)