

حماية أطفالكم الأعضاء من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، لا بد من الأخذ في الحسبان أن يتم تطعيمهم بمجرد أن يصلو لعمر مناسب لتلقي كل لقاح. هذا الجدول هو اقتراح لاكتساب مناعة مبكرة، مقدم من قبل منظمة حماية أطفالنا الغير ربحية. يجب عليك التحدث إلى طبيب الرعاية الأولية لطفلك لوضع جدول تحصين وفقا لبرنامج التطعيم في منطقتك السكنية وحالة تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح.

اسم اللقاح	تم إعطاؤه	0 دون عام السنة	1 سنة واحدة	2 سنتان	3 سنوات	4 سنوات	5 سنوات	6 سنوات	7 سنوات	8 سنوات	9	10	11	12	13
لقاح مضغف التهاب الكبد الوبائي B باستثناء الرقابة من العدوى في الفترة ما قبل و بعد الولادة	روتيني	□□□													
لقاح حي فيروس روتا (لقاح فموي)	روتيني	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح مضغف المكورات الرئوية لدى الأطفال	روتيني	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح مضغف اللقاح الخماسي المخسن الخناق/ السعال الديكي/ الكزاز/ شلل الأطفال/ الانفلونزا الدائمة من النوع ب	روتيني	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح حي مرض السيل	روتيني	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
لقاح حي MR الحصبة والحصبة الألمانية معاً	روتيني	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح حي مرض الحمق (جدي الماء)	روتيني	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح حي التكاف	اختياري	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح مضغف التهاب الدماغ الياباني	روتيني	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح mRNA كورونا المستجد	اختياري														
لقاح مضغف الانفلونزا	اختياري														
لقاح مضغف HPV (ثنائي التكاف، رباعي التكاف، تساعي التكاف) فيروس الورم الحليمي البشري	روتيني	□□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
لقاح مضغف المكورات السحائية	اختياري	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
لقاحات للمسافرين		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

لقاح حي	لقاح روتيني: بشكل عام مجاني (على حساب الحكومة) إذا تم إعطاؤه خلال المدة المحددة	العمر المستهدف للتطعيم الروتيني	الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم (تشير الأرقام إلى جرعات متتالية)	الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير المكتوبة في نشرة العبوة (*)
لقاح مضغف	لقاح اختياري: في الغالب مقابل رسوم (يدفعها الفرد) تقدم بعض البلديات مساعدات لتغطية تكلفتها. اللقاحات الاختياري ضرورية مثل اللقاحات الروتينية.	العمر الذي يمكن فيه إعطاء اللقاحات الاختياري	الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير مكتوبة في نشرة العبوة	
لقاح mRNA				

● يتطلب فترة على الأقل أربع أسابيع تكون فاصلة بين حقن اللقاحات الحية المختلفة. (يتوفر التطعيم مرة أخرى في نفس اليوم من الأسبوع بعد مرور 4 أسابيع)

قد يحتاج المسافرون إلى خارج البلاد إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء والتهاب الكبد الوبائي أ وداء الكلب بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة أعلاه. يجب عليك استشارة عيادة السفر حول الخضوع للتطعيم في أقرب وقت يناسبك بمجرد تأكيد خططك للسفر إلى الخارج.

يمكن أن يبدأ التطعيم من عمر سنتين ويوصى به للأطفال الذين سوف يدرسون في الخارج أو الذين يعيشون في مساكن الطلبة

التطعيمات التعويضية (مجانية) سوف تنتهي بنهاية مارس 2025. فلتحرصوا على الحصول عليها مبكراً.

الذكور يمكنهم تلقي اللقاح رباعي التكاف (تطعيم اختياري)

في حالة اللقاح تساعي التكاف، إذا كانت الجرعة الأولى لمن هم أقل من 15 سنة، فيتم تلقي التطعيم مرتين أو ثلاث مرات، ومن هم فوق سن 15 سنة يتم تلقي التطعيم 3 مرات

يوصى بالتطعيم لطلاب الصف السادس. (الفترة المستهدفة للتطعيم: الفتيات من الصف السادس إلى العاشر)

يوصى بالتطعيم في الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

قد يحتاج المسافرون إلى خارج البلاد إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء والتهاب الكبد الوبائي أ وداء الكلب بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة أعلاه. يجب عليك استشارة عيادة السفر حول الخضوع للتطعيم في أقرب وقت يناسبك بمجرد تأكيد خططك للسفر إلى الخارج.