

# টিকাদানের সময়সূচী

আপনার সন্তানদের VPD (টিকা দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব রোগ) থেকে রক্ষা করার জন্য, টিকা দানের সময়সূচী মনে রেখে যথাসম্ভব সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-প্রতিরক্ষা সমিতির মতানুসারে VPD (অনুমোদিত NPO) সম্পর্কে জানা এবং সঠিক সময়ে টিকাদান করা হলে জন্মের প্রথম দিকেই বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব। তাই সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে এলাকা ভিত্তিক টিকা দান পদ্ধতি এবং VPD এর মহামারী পরিস্থিতি বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করে আপনার শিশুকে টিকাদানের একটি সময়সূচী নির্ধারণ করুন।

টিকা বা ভ্যাকসিনের নাম	টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে	0 বছর	1 বছর	2 বছর	3 বছর	4 বছর	5 বছর	6 বছর	7 বছর	8 বছর	9 বছর	10 বছর	11 বছর	12 বছর	13 বছর
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> হেপাটাইটিস বি (মায়ের কাছ থেকে সন্তানে সংক্রমণ প্রতিরোধ ছাড়া)	নিয়মিত সময়	□□□	①→②→③	④											
<b>লাইভ ভ্যাকসিন</b> রোটোভাইরাস (মৌখিক টিকা বা ওরাল ভ্যাকসিন)	নিয়মিত সময়	□□□□	①→②→③	④											
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> নিউমোকোকাল জীবাণু (ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করা জীবাণু)	নিয়মিত সময়	□□□□	①→②→③	④											
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> পাঁচ ধরনের মিশ্র টিকা (ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, পোলিও ও হেমাফিলাস ইনফলুয়েঞ্জা টাইপ বি)	নিয়মিত সময়	□□□□	①→②→③	④											
<b>লাইভ ভ্যাকসিন</b> বিসিজি (BCG)	নিয়মিত সময়	□	①												
<b>লাইভ ভ্যাকসিন</b> এমআর (MR) (মিজেলস বা হাম এবং রুবেলার মিশ্রণ)	নিয়মিত সময়	□□		①											
<b>লাইভ ভ্যাকসিন</b> চিকেন পক্স	নিয়মিত সময়	□□	①	②											
<b>লাইভ ভ্যাকসিন</b> মাম্পস বা পনসিকা	স্বৈচ্ছায়	□□	①												
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> জাপানি এনসেফালাইটিস বা মস্তিষ্কপ্রদাহ	নিয়মিত সময়	□□□□													
<b>mRNA ভ্যাকসিন</b> নতুন করোনাভাইরাস	স্বৈচ্ছায়														
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> ইনফলুয়েঞ্জা	স্বৈচ্ছায়	প্রতিটি শরৎকালে													
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> এইচপিভি (HPV) 2-ভ্যালেন্ট, 4-ভ্যালেন্ট, 9-ভ্যালেন্ট (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস)	নিয়মিত সময়	□□□													
<b>নিক্রিয় ভ্যাকসিন</b> মেনিঙ্গোকোকাল জীবাণু	স্বৈচ্ছায়	□													
<b>ত্রমণকালীন টিকা</b>	□														

**লাইভ ভ্যাকসিন**    **নিয়মিত সময়**    নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হলে, নীতিগতভাবে বিনামূল্যে গ্রহণ করা যাবে (সরকারি বহন করবে)।

**নিক্রিয় ভ্যাকসিন**    **স্বৈচ্ছায়**    অধিকাংশ টিকার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করে, সরকারি ভর্তিকর ব্যবস্থা আছে। কোনো ব্যক্তির জন্য স্বৈচ্ছায় টিকাদান, নিয়মিত টিকাদানের মতোই প্রয়োজনীয়।

**mRNA ভ্যাকসিন**    mRNA ভ্যাকসিন

□ ক্রটিন টিকাদানের জন্য বয়স

□ স্বৈচ্ছায় টিকা গ্রহণের বয়স

↔ সুপারিশকৃত টিকাদানের সময় (সংখ্যা হল টিকাদানের সংখ্যা / কতবার)

↔ সংযুক্ত নথিতে তালিকাভুক্ত নয় এমন টিকাদানের সুপারিশকৃত সময়

(\*) সংযুক্ত নথিতে তালিকাভুক্ত নয় এমন টিকাদানের সুপারিশ

● বিভিন্ন ধরণের ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয়া লাইভ (জীবিত) ভ্যাকসিনের মধ্যকার টিকাদানের বিরাম কাল বা মধ্যবর্তী সময় কমপক্ষে 4 সপ্তাহ (4 সপ্তাহ পরে একই দিন থেকে টিকা গ্রহণ করা সম্ভব)।