Bersyong Abril, 2024

Iskedyul ng pagbabakuna

Upang protektahan ang ating mahahalagang mga anak mula sa VPD (mga sakit na puwedeng iwasan sa pamamagitan ng bakuna), mahalagang huwag malimutang bakunahan ang mga anak sa tamang pagkakataon ayon sa iskedyul. Ang iskedyul na ito ay isang panukala ng samahang "Kodomo wo mamorou no kai (Protect Our Children)" upang mabigyang ang mga bata ng panglaban sa sakit sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagkilala sa NPO VPD. Para sa pagbabakuna sa inyong mga anak, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor upang magtakda ng iskedyul ayon sa pamamaraan ng pagbabakuna at kalagayan ng pagkalat ng VPD sa inyong lugar.

Edad: 0 Taon, 1 Taon … 11 Taon (buwan); 1 Taon, 2 Taon … 11 Taon; 2 Taon, 3 Taon, 4 Taon, 5 Taon, 6 Taon, 7 Taon, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Edad)

Uri	Pangalan ng bakuna		Binakunahan na ☑	Iskedyul at paalala
Inactivated Vaccine	Hepatitis B (maliban sa pag-iwas sa paghawang ina-sa-anak)	Regular	☐☐☐	①–② (2–3 buwan), ③ (7–8 buwan). Kailangan ng 3 beses na pagbabakuna bago mag-isang taong gulang. Babakunahan ng ikatlo 4 hanggang 5 buwan matapos ang ikalawa. Inirerekomendang bakunahan sa lalong madaling panahon kapag hindi pa binabakunahan kahit higit pang isang taong gulang na. (Opsyonal na pagbabakuna)
Live Vaccine	Rota Virus (Iinom na bakuna)	Regular	RV 1 ☐☐; RV 5 ☐☐☐	1, 2, ③. May RV1 at RV5 ang bakuna laban sa Rota Virus. Kailangang simulan ang pagbabakuna bago mag-14 linggo at 6 na araw matapos ipanganak at bakunahan nang wastong ulit ng bawat uri.
Inactivated Vaccine	Pediatric Pneumococcal	Regular	☐☐☐☐	①–②–③ (2–4 buwan), ④ (1 taon – 1 taon 3 buwan)
Inactivated Vaccine	5 Mixed: Diphtheria, pertussis, tetanus, polio, Hib	Regular	☐☐☐☐	①–②–③ (2–4 buwan), ④. Upang maiwasang magka-pertussis, babakunahan nang minsan ng 3 Mixed Vaccine. (Opsyonal na pagbabakuna) Inirerekomenda rin ng WHO ang karagdagang pagbabakuna sa panahong ito. ⑤ (5–7 taon). 2 Mixed (DT): karagdagang pagbabakuna sa edad na 11 (Target ng pagbabakuna edad na 11-12) ①. Karaniwang bakunahan ng 3 Mixed vaccine sa ibang bansa. (Opsyonal na pagbabakuna)
Live Vaccine	BCG	Regular	☐	① (5–8 buwan)
Live Vaccine	MR (Pinagsamang Tigdas at Rubella)	Regular	☐☐	① (1 taon), ② (5–6 taon). Inirerekomendang bakunahan sa Abril hanggang Hunyo kapag nasa senior sa nursery o kindergarten.
Live Vaccine	Bulutong (Varicella)	Regular	☐☐	① (1 taon), ②
Live Vaccine	Beke	Opsyonal	☐☐	① (1 taon), ② (5–6 taon). Magpabakuna ng 2 beses upang magkaroon ng tiyak na immunity. (*)
Inactivated Vaccine	Japanese Encephalitis	Regular	☐☐☐☐	①②–③ (3–4 taon), ④ (9 taon). Karaniwang bakunahan mula sa edad na 3 ngunit maaaring bakunahan mula sa edad na 6 na buwan. Karagdagang pagbabakuna sa edad na 9. (Target ng pagbabakuna edad na 9-12)
mRNA Vaccine	Covid-19	Opsyonal		Maaaring magkaiba ang iskedyul ng bakuna depende sa edad ng babakunahan at uri ng bakuna. Mangyaring tingnan muna ang pinakabagong impormasyon.
Inactivated Vaccine	Influenza	Opsyonal	Tuwing Taglagas	Bakunahan natin mula bandang Oktubre hanggang Nobyembre bawat taon.
Inactivated Vaccine	HPV (Valent 2, 4, 9) (Human Papilloma Virus)	Regular	☐☐☐	Ang catch-up vaccination (walang bayad) ay matatapos sa Marso, 2025. Mangyaring magpabakuna na hangga't maaga. Ang mga lalaki ay maaaring magpabakuna ng 4-valent (opsyonal na bakuna). Kapag 9-valent na bakuna, 2 o 3 beses kung ang unang bakuna ay natanggap sa edad na mababa sa 15, at 3 beses naman kung edad 15 pataas. Magpabakuna kapag tumuntong sa grade 6. (Target ng regular na pagbabakuna: Ang mga batang babaeng nasa grade 6-10)
Inactivated Vaccine	Meningococcal	Opsyonal	☐	Puwedeng bakunahan mula sa edad na 2. Inirerekomenda ring bakunahan ang mga mag-aaral sa ibang bansa at titira sa dormitoryo.
	Bakuna para sa travel		☐	Kapag pupunta sa labas ng bansa, maaaring kailanganin ang bakuna laban sa Yellow Fever, Hepatitis A at Rabies dagdag pa sa mga nasa itaas. Kumunsulta sa travel clinic at iba pa kapag natiyak na ang pagpunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon.

Mahalagang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Pediatric Pneumococcal at 5 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang bilang ng pagbabakuna.

Kung dumating na ang unang kaarawan, bakunahan nang sabay-sabay. Maaaring mabakunahan nang sabay-sabay ng 5 uri na Pediatric Pneumococcal, 5 Mixed, MR, Bulutong at Beke.

Karaniwang bakunahan ng Polio vaccine sa edad na 4 pataas sa ibang bansa. (Opsyonal na pagbabakuna)

- Live Vaccine — Live Vaccine
- Inactivated Vaccine — Inactivated Vaccine
- mRNA Vaccine — mRNA vaccine
- Sabay-sabay na pagbabakuna: Maaaring bakunahan ng ilang mga bakuna nang sabay-sabay. Hindi naiiba ang kaligtasan nito sa pagbabakuna nang isa-isa. Inirerekomenda rin ng Pambansang pamahalaan at ng Japan Pediatric Society na magbakuna ng sabay (itaas na bahagi ng tagilirang hita). Mangyaring magtanong sa inyong doktor para sa mga detalye.
- Regular — Libre kapag babakunahan sa itinakdang panahon (pampublikong gastos).
- Opsyonal — Karamihan may bayad (sariling gastos). Maaaring may tulong ng pampublikong gastos depende sa lokal na pamahalaan. Hindi naiiba ang pangangailangan ng bakuna ng opsyonal na pagbabakuna sa bakuna ng regular na pagbabakuna.
- Target na edad para sa regular na pagbabakuna
- Edad na maaaring bakunahan ng pagbabakuna
- Inirerekomendang panahon ng pagbabakuna (ang numero ay ulit ng pagbabakuna)
- Inirerekomendang panahon ng pagbabakuna na hindi nakasaad sa nakalakip na dokumento
- (*) Kahit hindi nakasaad sa nakalakip na dokumento, inirerekomendang bakunahan
- Ang pagitan ng pagbabakuna ng magka-ibang uri ng parehong live vaccine ay 4 na linggo o higit pa. (Puwede nang bakunahan mula sa parehong araw ng linggo matapos ang 4 na linggo.)

Para sa mga detalye https://www.know-vpd.jp/ VPD Hanapin

Ginawa noong Pebrero, 2024

KNOW★VPD! Protect Our Children (NPO)